

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BVĐK VẠN PHƯỚC
Số: MM /TB-BVĐKVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Long Hương, ngày 21 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

Bổ sung Hướng dẫn sử dụng của các loại vắc xin tại BVĐK Vạn Phước cho trẻ em và người lớn

- Căn cứ Công văn số 193/BYT-GPHĐ của Bộ Y tế ngày 10/05/2016 về cấp Giấy phép hoạt động cho BVĐK Vạn Phước.
- Căn cứ theo thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 ban hành các loại vaccin và đối tượng cần phải tiêm chủng theo chương trình.
- Căn cứ Nghị Định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
- Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 06 năm 2024 về việc Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.
- Căn cứ Thông báo số 01/2019/TB-BVĐKVP ngày 25/02/2019 về việc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.
- Căn cứ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc xin.

BVĐK Vạn Phước thông báo đến các khoa/phòng liên quan thực hiện.

(Đính kèm bảng phụ lục các lịch tiêm chủng của các loại vắc xin dịch vụ)

Nơi nhận:

- Giám Đốc;
- Các khoa/phòng/bộ phận;
- Lưu VT, KHTH;



LÊ NGUYỄN QUẾ MINH




Phụ lục

(Đính kèm Công văn số: 111/TB-BVĐKVP ngày 21/05/2026)

LỊCH TIÊM CHUNG CÁC LOẠI VẮC XIN DỊCH VỤ

Thông tin vắc xin	LOẠI VẮC XIN	ĐỐI TƯỢNG	LỊCH TIÊM
1. Vắc xin Não mô cầu: A,C,Y,W-135	Nimenrix 0.5ml	Trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên và người lớn	<ul style="list-style-type: none">* Trẻ từ tròn 6 tuần tuổi đến dưới 6 tháng tuổi: Tiêm 3 mũi- Mũi 1: Lần tiêm đầu tiên khi trẻ được tròn 6 tuần tuổi.- Mũi 2: Cách mũi 1 ít nhất 2 tháng.- Mũi 3: Khi trẻ \geq 12 tháng tuổi và cách mũi 2 ít nhất là 2 tháng.* Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi: Tiêm 2 mũi- Mũi 1: Lần đầu tiên khi trẻ tròn 6 tháng tuổi.- Mũi 2: Khi trẻ \geq 12 tháng tuổi và cách mũi 1 là ít nhất 2 tháng* Trẻ từ tròn 1 tuổi trở lên: Tiêm 1 mũi Lần đầu tiên khi trẻ tròn 1 tuổi (mũi cơ bản).* Tiêm nhắc lại từ lúc trẻ đạt 15 tuổi (cách mũi trước ít nhất 4 năm).
2. Vắc xin Viêm gan AB	Twinrixvia 1ml	<ul style="list-style-type: none">* Trẻ em từ 1 đến 15 tuổi.* Thanh thiếu niên và người lớn (từ 16 tuổi trở lên)	<ul style="list-style-type: none">* Trẻ em từ 1 đến 15 tuổi: Tiêm 2 liều- Mũi 1: Tiêm lần đầu tiên.- Mũi 2: Cách Mũi 1 là 6 tháng.* Từ 16 tuổi trở lên: Tiêm 3 mũi (0-1-6)- Mũi 1: Lần đầu tiên.- Mũi 2: Cách mũi 1 ít nhất 1 tháng.- Mũi 3: Cách mũi 2 ít nhất là 5 tháng.* Ghi chú: Nếu lịch tiêm bị gián đoạn, không cần thiết phải tiêm lại từ đầu.
			<ul style="list-style-type: none">Tiêm 2 liều:- Liều 1.- Liều 2: cách Liều 1 từ 2 đến 6 tháng* Ghi chú: có thể tiêm chung với các vắc xin sau

<p>3. Vắc xin Herpes zoster</p>	<p>Shingrix 50mcg/0.5ml</p>	<p>* Người lớn từ 50 tuổi trở lên có đau dây thần kinh sau khi mắc herpes. * Người lớn từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc HZ</p>	<p>- Cúm mùa không chất bổ trợ (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra). - Cộng hợp phế cầu (PCV): Synflorix, Prevenar 13. - BH-UV-HG (có thành phần vô bào, được hấp phụ, thành phần được giảm kháng nguyên): dTpa.</p>
<p>4. Thủy đậu</p>	<p>VaRilRix (0.5ml)</p>	<p>* Trẻ em từ 9 tháng đến 12 tuổi. * Từ 13 tuổi trở lên</p>	<p>* Trẻ em từ 9 tháng đến 12 tuổi: Tốt nhất là tiêm 2 liều, liều thứ 2 cách liều thứ nhất là 6 tuần. * Trẻ từ 13 tuổi trở lên: Tiêm 2 liều - Liều 1: Lần tiêm đầu tiên. - Liều 1: Cách Liều 1 ít nhất 6 tuần. * Ghi chú: - Không tiêm cho phụ nữ có thai, nên tránh có thai sau khi tiêm vắc xin 1 tháng. - Ở người khỏe mạnh: VaRilRix có thể tiêm cùng với bất kỳ vắc xin nào.</p>

 9/2